

FICHA TÉCNICA

CONCEPTAL®

USO VETERINARIO

RESUMEN DE LA DESCRIPCIÓN

FÓRMULA:	Cada ml contiene: Acetato de buserelina 0.00042 mg* Vehículo c.b.p 1 ml *equivalente a 0.004 mg de buserelina
PRESENTACIÓN COMERCIAL:	Frasco con 10 ml.
INDICACIONES:	Para el tratamiento de quistes foliculares, anestro, retraso en la ovulación y sincronización de la ovulación en bovinos, equinos y conejas.



ESPECIES DESTINO:

Bovinos, equinos y conejos.

FORMA FARMACÉUTICA:

Suspensión inyectable

DESCRIPCIÓN:

Solución inyectable contiene buserelina, análogo de la hormona liberadora de gonadotropinas (GnRH) la cual estimula la secreción de la hormona luteinizante (LH) y foliculoestimulante (FSH).

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Administrar preferentemente por vía intramuscular. También se puede administrar por vía intravenosa o subcutánea.

Vacas:

Quistes foliculares con o sin síntomas de ninfomanía 5 ml

Anestro 5 ml

Ovulación retardada 2.5 ml

Atresia folicular 2.5 ml

Incremento del índice de concepción en la inseminación artificial y también tras de la sincronización del celo 2.5 ml

Profilaxis de los trastornos de la fecundidad por inducción prematura del ciclo posparto 5 ml

Yeguas:

Trastornos quísticos de los ovarios acompañados o no de celo prolongado o permanente 10 ml

Inducción de la ovulación para fijar mejor el tiempo de la ovulación y la monta 10 ml

Para mejorar el índice de concepción 10 ml

En celo prolongado permanente 10 ml

Conejas:

Para mejorar el índice de concepción 0.2 ml

Inducción de la ovulación en la inseminación posparto 0.2 ml

CONTRAINDICACIONES:

No administrar en animales con hipersensibilidad a los betalactámicos o a la dihidroestreptomicina.

PRECAUCIONES ESPECIALES:

Precauciones para su uso en animales:

En caso de sobredosis, o error en la vía de aplicación del producto, acuda o llame inmediatamente al médico veterinario y presente la etiqueta del producto.

<i>Sobredosis en humanos (síntomas, procedimientos de emergencia y antídotos):</i>	
En caso de exposición inadecuada al producto, o ingestión de este, acuda a un Centro Hospitalario y presente la etiqueta del producto.	
<i>Precauciones de Almacenamiento:</i>	
Consérvese en refrigeración entre 2 a 8 °C.	
Una vez abierto el producto puede almacenarse a una temperatura entre 2 a 8 °C por 24 horas.	
PERIODO DE RETIRO:	
Para todas las especies es de cero días.	
No administrar a equinos destinados para consumo humano.	
PRECAUCIONES PARA LA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO NO UTILIZADO O LOS MATERIALES DE DESECHO:	
Si no se describe ninguna especificación especial en la etiqueta para eliminar este producto, deseche de la misma manera en que dispone de otros productos.	
INFORMACIÓN ADICIONAL: https://www.msd-salud-animal.com.pa/	
PARA USO VETERINARIO EXCLUSIVAMENTE.	
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.	
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.	
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS.	
ELABORADO POR: INTERVET INTERNATIONAL GMBH Alemania.	IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: INTERVET CENTRAL AMERICA S DE RL Bajo Licencia de Intervet International B.V.