

FICHA TÉCNICA

BOVILIS® VISTA 5 L5 SQ

USO VETERINARIO

RESUMEN DE LA DESCRIPCIÓN

FÓRMULA:	<p>Cada dosis de 2 ml contiene:</p> <p>Cada dosis de 2 ml contiene:</p> <p>Virus de la Rinotraqueítis Infecciosa Bovina (IBR) $\geq 10^{3.6}$ TCID₅₀</p> <p>Virus de la Diarrea Viral Bovina (DVB) Tipo 1 $\geq 10^{3.8}$ TCID₅₀</p> <p>Virus de la Diarrea Viral Bovina (DVB) Tipo 2 $\geq 10^{3.5}$ TCID₅₀</p> <p>Virus de la Parainfluenza (PI3) Tipo 3 $\geq 10^{5.1}$ TCID₅₀,</p> <p>Virus Respiratorio Sincitial Bovino (BRSV) $\geq 10^{3.8}$ TCID₅₀</p> <p><i>Leptospira canicola</i> Inactivada ≥ 1.2 RP</p> <p><i>Leptospira grippotyphosa</i> Inactivada ≥ 1.2 RP</p> <p><i>Leptospira hardjo</i> Inactivada ≥ 1.1RP</p> <p><i>Leptospira icterohaemorrhagiae</i> Inactivada ≥ 1.3RP</p> <p><i>Leptospira pomona</i> Inactivada ≥ 1.0RP</p> <p>Vehículo c.b.p. 2 ml</p> <p>*RP= Potencia Relativa</p>
-----------------	--

PRESENTACIÓN COMERCIAL: Frascos de 10 dosis / 20 ml.

INDICACIONES:

Para la vacunación de vacas y terneras sanas de seis meses de edad o mayores antes de la monta, como ayuda en la reducción de abortos debidos a IBR, en la prevención de la infección fetal, incluyendo la presencia de becerros persistentemente infectados a causa del virus de la DVB tipo 1 y tipo 2, y en la prevención de las enfermedades causadas por IBR, DVB (Tipo 2) y BRSV.

Como ayuda en el control de las enfermedades causadas por DVB (tipo1) y PI3. Como ayuda en la prevención de la leptospirosis causada por *Leptospira interrogans serovares canicola, grippotyphosa, hardjo, icterohaemorrhagiae y pomona.*

ESPECIES DESTINO:

Bovinos

FORMA FARMACÉUTICA:

Producto combinado que consiste en virus liofilizado vacuna y bacterina líquida

MECANISMO DE ACCIÓN:

Es una vacuna-bacterina, que contiene cultivos vivos modificados del virus de la rinotraqueítis infecciosa bovina (IBR), virus de la diarrea viral bovina (BVD) (Tipos 1 y 2), virus de parainfluenza 3 (PI3), virus respiratorio sincitial bovino (BRSV) y cultivos de *L. canicola*, *L. grippotyphosa*, *L. hardjo*, *L. icterohaemorrhagiae* y *L. Pomona* con un adyuvante patentado

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Injectar 2.0 mL por vía subcutánea 14-60 días antes de la monta y a bovinos sanos de 6 meses de edad o mayores.

Se recomienda la revacunación anual.

Para la revacunación se puede administrar una dosis a intervalos más frecuentes basados en la evaluación del riesgo u otras condiciones de epidemia que existan o sean reportadas en cada explotación.

Consulte al Médico Veterinario.

FOTO DEL
PRODUCTO

1

CONTRAINDICACIONES:	
Ninguna.	
PRECAUCIONES ESPECIALES:	
<i>Precauciones para su uso en animales:</i>	
En caso de sobredosis, o error en la vía de aplicación del producto, acuda o llame inmediatamente al médico veterinario y presente la etiqueta del producto.	
<i>Sobredosis en humanos (síntomas, procedimientos de emergencia y antídotos):</i>	
En caso de exposición inadecuada al producto, o ingestión de este, acuda a un Centro Hospitalario y presente la etiqueta del producto.	
<i>Precauciones de Almacenamiento:</i>	
Almacenar en refrigeración (2 y 7 °C).	
No congelar.	
Utilizar inmediatamente después de reconstituida.	
PERIODO DE RETIRO:	
No vacunar dentro de los 21 días anteriores al sacrificio.	
PRECAUCIONES PARA LA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO NO UTILIZADO O LOS MATERIALES DE DESECHO:	
Si no se describe ninguna especificación especial en la etiqueta para eliminar este producto, deseche de la misma manera en que dispone de otros productos.	
INFORMACIÓN ADICIONAL: https://www.msd-salud-animal.com.pa/	
PARA USO VETERINARIO EXCLUSIVAMENTE.	
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.	
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.	
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS.	
ELABORADO POR: Intervet Inc. Estados Unidos de Norteamérica	IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: INTERVET CENTRAL AMERICA S DE RL Bajo Licencia de Intervet International B.V.