

**MSD**

Animal Health

**FICHA TÉCNICA****NOBIVAC® DAPPvL2****USO VETERINARIO****VACUNA PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL DISTEMPER, ADENOVIRUS TIPO 1 y 2, PARAINFLUENZA, PARVOVIRUS Y LEPTOSPIROSIS CANINA****FÓRMULA:**

Cada dosis contiene:
 Virus vivos atenuados
 Virus de Distemper canino, cepa Distemperoide $\geq 10^{3.7}$ TCID₅₀ /dosis
 Adenovirus canino tipo 2, cepa Ditchfield $\geq 10^{4.8}$ TCID₅₀ /dosis
 Virus de Parainfluenza canina, cepa CPI-PR $\geq 10^{4.3}$ TCID₅₀ /dosis
 Parvovirus canino, cepa SAH-CPV-2b $\geq 10^{5.1}$ FAID₅₀ /dosis

Bacterina:

Leptospira Canicola, cepa LC-NY ≥ 80 hamster PD₈₀
Leptospira Icterohaemorrhagiae, cepa LI-11403 J ≥ 80 hamster PD₈₀

Excipientes c.s.p. 1 ml

PRESENTACIÓN COMERCIAL:

Caja con 25 unidades de frasco/vial con liofilizado por 1 dosis acompañado por diluyente estéril.

INDICACIONES:

Para la vacunación de perros sanos como una ayuda en la prevención de las enfermedades causadas por el virus del Distemper canino, Adenovirus canino tipo 1 (hepatitis), Adenovirus canino tipo 2 (enfermedad respiratoria), virus de Parainfluenza canina y Parvovirus canino; y contra la Leptospirosis causada por *L. Canicola* y *L. Icterohaemorrhagiae*.

**ESPECIES DESTINO:** Perros**FORMA FARMACÉUTICA:** Polvo liofilizado y diluyente para reconstituir suspensión inyectable**DESCRIPCIÓN:**

Nobivac® DAPPvL2 es una vacuna de virus vivos atenuados que se combina con una bacterina de *Leptospira Canicola* y *Leptospira Icterohaemorrhagiae*

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Transfiera el contenido del vial de diluyente estéril al vial de **Nobivac® DAPPvL2** de forma aséptica.
 Mezclar suavemente hasta que se reconstituya.
 Inmediatamente después de rehidratar, use todo el contenido.
 Inyecte una dosis (1 ml) subcutáneamente o intramuscularmente.

PROGRAMA DE VACUNACIÓN:

La primovacunación deberá realizarse en cachorros de seis semanas de edad o mayores, repetir la vacunación a intervalos de 2 a 4 semanas hasta que el cachorro cumpla las 12 semanas o tres meses de edad.
 Revacunación: Se recomienda la revacunación anual con una dosis.

CONSEJOS PARA LA ADMINISTRACIÓN CORRECTA:

Sólo deberán vacunarse animales sanos y deberá realizarse una exploración clínica adecuada antes de la inoculación.
 Utilice material estéril para la administración.

CONTRAINDICACIONES:

Ninguna

1



MSD

Animal Health



2

REACCIONES ADVERSAS:	
Puede producirse una reacción anafiláctica después de su aplicación, utilizar como tratamiento epinefrina, corticosteroides o antihistamínicos de acuerdo a la naturaleza y severidad de la reacción.	
ADVERTENCIAS:	
Vacune únicamente animales sanos, sin signos clínicos de enfermedad y desparasitados. Contiene gentamicina y timerosal como conservadores. Manténgase fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos.	
PRECAUCIONES ESPECIALES:	
Precauciones para su uso en animales:	
En caso de sobredosis, o error en la vía de aplicación del producto, acuda o llame inmediatamente al médico veterinario y presente la etiqueta del producto.	
Gestación, lactancia y fertilidad:	
No vacunar hembras gestantes, ni lactantes.	
Sobredosis en humanos (síntomas, procedimientos de emergencia y antídotos):	
En caso de exposición inadecuada al producto, o ingestión de este, acuda a un Centro Hospitalario y presente la etiqueta del producto.	
Precauciones de Almacenamiento:	
Almacene entre 2° y 8°C. NO CONGELE. Protéjase de la luz	
PERIODO DE RETIRO:	
No aplica.	
PRECAUCIONES PARA LA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO NO UTILIZADO O LOS MATERIALES DE DESECHO:	
Si no se describe ninguna especificación especial en la etiqueta para eliminar este producto, deseche de la misma manera en que dispone de otros productos.	
INFORMACIÓN ADICIONAL: https://www.msd-salud-animal.com.pa/	
PARA USO VETERINARIO EXCLUSIVAMENTE.	
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.	
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.	
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS.	
ELABORADO POR: Intervet Inc. EE.UU.	IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: INTERVET CENTRAL AMERICA S DE RL Bajo Licencia de Intervet International B.V.

En caso de eventos adversos o farmacovigilancia reportarlo a: farmacovet@merck.com
Copyright © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA and its affiliates. All rights reserved.

Intervet Central América S de RL. Avenida Paseo del Mar, Costa del Este, Torre MMG, Piso 15. Ciudad de Panamá.

www.msd-salud-animal.com.pa