

**MSD**

Animal Health



1

FICHA TÉCNICA**NOBIVAC® HCPCh +FeLV****USO VETERINARIO****VACUNA PARA LA PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD CAUSADA POR LOS VIRUS DE LA RINOTRAQUEITIS, CALCIVIRUS, PANLEUCOPENIA, LEUCEMIA FELINA Y *CHLAMYDIA PSITTACI***

FÓRMULA:	Herpesvirus felino (HVF), Cepa 593-J $\geq 10^{4.7}$ PFU Calicivirus Felino (FCV) Cepa 894-T $\geq 10^{3.1}$ PFU Virus de la Panleucopenia Felina (FPL) cepa Philips Roxane $\geq 10^{3.0}$ FAID ₅₀ <i>Chlamydia psittaci</i> , (FPn), Cepa Baker $\geq 10^{2.5}$ YSLD ₅₀ Virus de la Leucemia Felina (FeLV), Aislamiento Rickard ≥ 1.0 RP
-----------------	---

PRESENTACIÓN COMERCIAL:	Caja con 25 unidades de frasco/vial con liofilizado por 1 dosis acompañado por diluyente estéril.
--------------------------------	---

INDICACIONES:	Nobivac® HCPCh + FeLV se recomienda para la vacunación de gatos sanos como una ayuda en la prevención de las enfermedades causadas por Herpesvirus (Rinotraqueítis felina), Calicivirus felino y Panleucopenia felina; y la Clamidiiasis producida por <i>Chlamydia psittaci</i> . Se recomienda para la vacunación de gatos sanos como una ayuda en la prevención de los tumores linfoides y las enfermedades asociadas con la infección por el virus de la Leucemia felina (FeLV). La vacunación con este producto previene la viremia persistente en gatos expuestos al virus de la Leucemia felina.
----------------------	---

**ESPECIES DESTINO:** Gatos**FORMA FARMACÉUTICA:** Liofilizado y solvente en suspensión inyectable.**DESCRIPCIÓN:**

Nobivac® HCPCh + FeLV es una combinación de vacunas que une los beneficios de las vacunas **Nobivac® Feline HCPCh** y **Nobivac® FeLV** en una sola vacunación. **Nobivac® Feline HCPCh** conforma la fracción liofilizada, contiene virus vivos atenuados de la Rinotraqueítis Felina (FVR), el Calicivirus Felino (FCV), la Panleucopenia Felina (FPL) y *Chlamydia psittaci* (FPn) que estimulan una inmunización activa reduciendo los signos clínicos y la excreción viral. **Nobivac® FeLV** conforma la fracción líquida, contiene virus inactivado de la Leucemia Felina (FeLV) subgrupos A y B combinado con un adyuvante acuoso para incrementar la respuesta inmune, previene el desarrollo de tumores linfoides y la viremia persistente en gatos expuestos al virus de la Leucemia Viral Felina.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Administrar 1 ml de vacuna reconstituida por vía subcutánea o intramuscular.

Consejos para la administraciónAntes de utilizar, permita que **Nobivac® FeLV** alcance la temperatura ambiente; agitar bien.Transferir el contenido del vial de **Nobivac® FeLV** al vial de **Nobivac® HCPCh** asépticamente.

Mezclar suavemente hasta que se disuelva. Usar todo el contenido inmediatamente después de la rehidratación.



MSD

Animal Health



2

PROGRAMA DE VACUNACIÓN:

Se requieren dos dosis para la inmunización primaria.

Para la vacunación inicial: Inyectar una dosis (1 ml) por vía subcutánea o intramuscular a las 9 semanas de edad o mayores.

Segunda vacunación: Inyectar una dosis (1 ml) por vía subcutánea o intramuscular 3 a 4 semanas después de la vacunación inicial.

Revacunar cada dos años con una sola dosis de **Nobivac® HCPCh + FeLV**.

Se recomienda la revacunación en los años intermedios con **Nobivac® HCP**.

Los estudios indican que los gatos vacunados con **Nobivac® HCPCh + FeLV** están protegidos contra la viremia persistente FeLV durante al menos dos años después de la vacunación.

Es importante resaltar que ciertas condiciones y eventos pueden causar que en ciertos gatos no sea posible desarrollar o mantener una adecuada respuesta inmune seguida de la vacunación con FeLV. Previo a la exposición con la enfermedad, o una enfermedad latente, son condiciones en las cuales la vacuna podría no alterar el curso de la enfermedad. Por lo tanto, previo a la administración de esta vacuna es indispensable determinar si el gato es negativo a FeLV (en gatos positivos a FeLV no se recomienda administrar vacunas que contengan este antígeno). También, la vacunación con este producto no ofrecerá protección cruzada contra el virus de la inmunodeficiencia felina (FIV), otro retrovirus felino. Es importante notificar al propietario del gato de esta situación antes de la vacunación.

CONTRAINDICACIONES:

No vacunar durante la gestación y lactancia.

REACCIONES ADVERSAS:

Puede producir anafilaxia y/u otras reacciones inflamatorias de hipersensibilidad, epinefrina, corticosteroides, y antihistamínicos pueden ser indicados dependiendo de la naturaleza y severidad de la reacción.

ADVERTENCIAS:

Vacune únicamente animales sanos.

Contiene gentamicina y anfotericina B como conservadores.

Manténgase fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos.

PRECAUCIONES ESPECIALES:

Precauciones para su uso en animales:

En caso de sobredosis, o error en la vía de aplicación del producto, acuda o llame inmediatamente al médico veterinario y presente la etiqueta del producto.

Sobredosis en humanos (síntomas, procedimientos de emergencia y antídotos):

En caso de exposición inadecuada al producto, o ingestión de este, acuda a un Centro Hospitalario y presente la etiqueta del producto.

Precauciones de Almacenamiento:

Almacene entre 2° y 8°C.

NO CONGELE.

Protéjase de la luz.

PERIODO DE RETIRO:

No aplica.

PRECAUCIONES PARA LA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO NO UTILIZADO O LOS MATERIALES DE DESECHO:

Si no se describe ninguna especificación especial en la etiqueta para eliminar este producto, deseche de la misma manera en que dispone de otros productos.



MSD

Animal Health



3

INFORMACIÓN ADICIONAL: https://www.msd-salud-animal.com.pa/	
PARA USO VETERINARIO EXCLUSIVAMENTE.	
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.	
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.	
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS.	
ELABORADO POR: Intervet Inc. EE.UU.	IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: INTERVET CENTRAL AMERICA S DE RL Bajo Licencia de Intervet International B.V.

En caso de eventos adversos o farmacovigilancia reportarlo a: farmacovet@merck.com
Copyright © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA and its affiliates. All rights reserved.

Intervet Central América S de RL. Avenida Paseo del Mar, Costa del Este, Torre MMG, Piso 15. Ciudad de Panamá.

www.msd-salud-animal.com.pa