

**MSD**

Animal Health

**FICHA TÉCNICA****NOBIVAC® KC****USO VETERINARIO****VACUNA PARA LA PREVENCIÓN DE LA TRAQUEOBRONQUITIS INFECCIOSA CANINA (TOS DE LAS PERRERAS)****FÓRMULA:**

Cada dosis contiene  
*Bordetella Bronchiseptica*, cepa B-C2  $\geq 10^{8.3}$  CFU  
 Virus de la Parainfluenza canina, cepa Cornell  $\geq 10^{3.8}$  TCDI<sup>50</sup>  
 Vehículo c.b.p. 1 dosis

**PRESENTACIÓN COMERCIAL:**

Caja con 5 frascos de 1 dosis cada uno, con diluyente.

**INDICACIONES:**

Para la prevención de la traqueobronquitis infecciosa canina ("tos de las perreras") debida a la infección por el virus de la Parainfluenza canina y *Bordetella Bronchiseptica*.

**ESPECIES DESTINO:** Perros**FORMA FARMACÉUTICA:** Vacuna liofilizada con diluyente.**DESCRIPCIÓN:**

Es una vacuna modificada de aplicación intranasal que contiene el virus atenuado de la Parainfluenza canina, cepa Cornell y un cultivo avirulento de *Bordetella Bronchiseptica*, cepa B-C2. Se presenta en forma liofilizada con diluyente estéril para su reconstitución.

**DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:**

Se aplica por vía intranasal en cachorros y perros adultos sanos.  
 Reconstituya en forma aséptica la vacuna con el diluyente adjunto.  
 Retire la aguja y administre 0.4 ml en un orificio nasal. Debido al volumen reducido de la vacuna, no se requiere de un hisopo aplicador para administrarla.

**PROGRAMA DE VACUNACIÓN:**

Los cachorros sanos, a partir de las tres semanas de edad, y los perros, deben ser vacunados por lo menos 72 horas antes del confinamiento o cuando pudiera existir el riesgo de infección por TIC.  
 Revacunar anualmente.

La vacunación con **Nobivac® KC** estimula una respuesta inmune local y rápida en el tracto respiratorio, por lo tanto, inhibe la infección en el sitio de entrada y previene la aparición de signos clínicos. La protección contra *Bordetella Bronchiseptica* después de la vacunación ocurre a las 72 horas post-vacunación. Además de la respuesta inmune local, también estimula una inmunidad sistémica vs Parainfluenza canina dentro de las tres semanas posteriores a su aplicación intranasal. El pequeño volumen para administrar (0.4 ml), así como la vía de administración intranasal, permiten una fácil aplicación especialmente en los cachorros jóvenes de razas pequeñas.

**CONSEJOS PARA LA ADMINISTRACIÓN CORRECTA:**

- Sólo deberán vacunarse animales sanos.
- Utilice material estéril para la administración.
- No deben utilizarse jeringas o agujas esterilizadas químicamente para la aplicación de la vacuna.
- Agite bien antes de usar.
- La vacuna deberá utilizarse antes de los 30 minutos posteriores a su reconstitución.

**CONTRAINDICACIONES:**

Ninguna.

1



# MSD

## Animal Health



2

**REACCIONES ADVERSAS:**

No se presentaron reacciones post-vacunales en el 99.7% de los animales tratados.

En caso de reacción anafiláctica, epinefrina, corticosteroides, y antihistamínicos pueden ser indicados dependiendo de la naturaleza y severidad de la reacción.

**ADVERTENCIAS:**

Vacune únicamente animales sanos. Los animales que incuban alguna enfermedad, o animales bajo condiciones de estrés debido al transporte, malnutrición o parasitosis podrían no presentar ni mantener una inmunidad adecuada. Manténgase fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos.

**PRECAUCIONES ESPECIALES:*****Precauciones para su uso en animales:***

En caso de sobredosis, o error en la vía de aplicación del producto, acuda o llame inmediatamente al médico veterinario y presente la etiqueta del producto.

**Gestación, lactancia y fertilidad:**

Se pueden vacunar hembras gestantes

***Sobredosis en humanos (síntomas, procedimientos de emergencia y antídotos):***

En caso de exposición inadecuada al producto, o ingestión de este, acuda a un Centro Hospitalario y presente la etiqueta del producto.

***Precauciones de Almacenamiento:***

Almacene entre 2° y 8°C.

No congele.

**PERIODO DE RETIRO:**

No aplica.

**PRECAUCIONES PARA LA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO NO UTILIZADO O LOS MATERIALES DE DESECHO:**

Si no se describe ninguna especificación especial en la etiqueta para eliminar este producto, deseche de la misma manera en que dispone de otros productos.

**INFORMACIÓN ADICIONAL:** <https://www.msd-salud-animal.com.pa/>

**PARA USO VETERINARIO EXCLUSIVAMENTE.**

**CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.**

**SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.**

**MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS.**

ELABORADO POR:

**Intervet International BV.**

**Países Bajos.**

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

**INTERVET CENTRAL AMERICA S DE RL**

**Bajo Licencia de Intervet International B.V.**

En caso de eventos adversos o farmacovigilancia reportarlo a: [farmacovet@merck.com](mailto:farmacovet@merck.com)  
Copyright © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA and its affiliates. All rights reserved.

Intervet Central América S de RL. Avenida Paseo del Mar, Costa del Este, Torre MMG, Piso 15. Ciudad de Panamá.

[www.msd-salud-animal.com.pa](https://www.msd-salud-animal.com.pa)