

**MSD**

Animal Health

**FICHA TÉCNICA****NOBIVAC® PV****USO VETERINARIO****VACUNA A VIRUS VIVO ATENUADO PARA LA PREVENCIÓN DE PARVOVIRUS CANINO****FÓRMULA:** Parvovirus Canino SAH-CPV, cepa 2b $\geq 10^{5.1}$ FAID₅₀**PRESENTACIÓN COMERCIAL:** Caja plástica conteniente de 25 viales de 1 ml (1 dosis) cada uno.**INDICACIONES:** Vacuna para la inmunización de perros sanos contra la Parvovirus canina.**ESPECIES DESTINO:** Perros**FORMA FARMACÉUTICA:** Solución inyectable**DESCRIPCIÓN:**

Vacuna a virus vivo atenuado que contiene una cepa de Parvovirus Canino Tipo 2b para la vacunación de perros sanos como una ayuda en la prevención de la enfermedad causada por el parvovirus canino.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Inyectar una dosis (1 ml) por vía subcutánea o intramuscular.

La dosis inicial puede administrarse a partir de las 6 semanas o más de edad. Para asegurar la protección de cachorros individuales que no responden a esta edad por niveles muy elevados de Anticuerpos Derivados de la Madre, y proporcionar protección contra moquillo, hepatitis (CAV1), infecciones por CAV 2, Parainfluenza y Leptospirosis, se aconseja continuar la vacunación con **Nobivac® DAPPvL2** o **NOBIVAC® DAPPvL2 + Cv** o **Nobivac® DAPPv+L4** a intervalos de 2 a 4 semanas, hasta que el cachorro cumpla las 12 semanas de edad (verificar disponibilidad de productos en cada país).

Usar todo el contenido inmediatamente.

CONSEJOS PARA LA ADMINISTRACIÓN CORRECTA:

- Sólo deberán vacunarse animales sanos y deberá realizarse una exploración clínica adecuada antes de la inoculación.
- Utilice material estéril para la administración.
- Evite la contaminación de la vacuna con restos de desinfectantes o alcohol.

CONTRAINDICACIONES:

No mezclar con otros productos.

REACCIONES ADVERSAS:

Puede producir anafilaxia y/u otras reacciones inflamatorias de hipersensibilidad, igual que puede suceder con todas las proteínas extrañas. Epinefrina, corticosteroides, y antihistamínicos pueden ser indicados dependiendo de la naturaleza y severidad de la reacción.

ADVERTENCIAS:

Vacune únicamente animales sanos.

Después de la vacunación, deberá evitarse el contacto con fuentes potenciales de infección hasta 14 días después de la inoculación. Manténgase fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos.

PRECAUCIONES ESPECIALES:**Precauciones para su uso en animales:**

En caso de sobredosis, o error en la vía de aplicación del producto, acuda o llame inmediatamente al médico veterinario y presente la etiqueta del producto.



1



MSD

Animal Health



2

Gestación, lactancia y fertilidad:	
No se pueden vacunar hembras gestantes	
Sobredosis en humanos (síntomas, procedimientos de emergencia y antídotos):	
En caso de exposición inadecuada al producto, o ingestión de este, acuda a un Centro Hospitalario y presente la etiqueta del producto.	
Precauciones de Almacenamiento:	
Almacene entre 2° y 8°C. NO CONGELE.	
PERIODO DE RETIRO:	
No aplica.	
PRECAUCIONES PARA LA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO NO UTILIZADO O LOS MATERIALES DE DESECHO:	
Si no se describe ninguna especificación especial en la etiqueta para eliminar este producto, deseche de la misma manera en que dispone de otros productos.	
INFORMACIÓN ADICIONAL: https://www.msd-salud-animal.com.pa/	
PARA USO VETERINARIO EXCLUSIVAMENTE.	
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.	
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.	
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS.	
ELABORADO POR: Intervet Inc., EE.UU.	IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: INTERVET CENTRAL AMERICA S DE RL Bajo Licencia de Intervet International B.V.

En caso de eventos adversos o farmacovigilancia reportarlo a: farmacovet@merck.com
Copyright © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA and its affiliates. All rights reserved.

Intervet Central América S de RL. Avenida Paseo del Mar, Costa del Este, Torre MMG, Piso 15. Ciudad de Panamá.

www.msd-salud-animal.com.pa