

**MSD**

Animal Health



2

DESCRIPCIÓN:

Tabletas masticables para el tratamiento de infestaciones por garrapatas, pulgas, ácaros de la sarna demodéica y por el ácaro *Otodectes spp.*

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Para uso oral.

Dosis:

Peso corporal (kg) del perro	Número y concentración de la tableta que se administrará				
	Bravecto® 1M 45 mg	Bravecto® 1M 100 mg	Bravecto® 1M 200 mg	Bravecto® 1M 400 mg	Bravecto® 1M 560 mg
2 - 4.5 kg	1				
>4.5 - 10		1			
>10 - 20			1		
>20 - 40				1	
>40 - 56					1

Para perros de más de 56 kg deben utilizarse combinaciones adecuadas de tabletas masticables. Una dosis insuficiente podría resultar en un uso ineficaz y podría favorecer el desarrollo de resistencias.

Método de administración:

Administrar Bravecto® 1M Tabletas masticables en el momento o cerca de la alimentación.

Bravecto® 1M es una tableta masticable y es bien aceptado por la mayoría de los perros. Si el perro no toma la tableta voluntariamente, también puede administrarse con la comida o directamente en el hocico. El perro debe ser observado durante la administración para confirmar que la tableta es tragada.

Esquema de tratamiento:

Para un control óptimo de la infestación por pulgas y garrapatas, el medicamento veterinario debe administrarse en intervalos de 1 mes. Bravecto® 1M puede administrarse durante todo el año.

Para el tratamiento de Demodicosis causada por ácaros *Demodex spp.*, el producto debe administrarse en intervalos mensuales durante 3 meses consecutivos. La demodicosis es una enfermedad multifactorial, se recomienda el diagnóstico y el tratamiento adecuado de cualquier padecimiento subyacente.

Para el tratamiento de infestaciones de ácaros del oído (*Otodectes spp.*), el producto debe administrarse en intervalos mensuales durante dos meses consecutivos.

CONTRAINDICACIONES:

No utilizar en caso de hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes.

PRECAUCIONES ESPECIALES:**Precauciones para su uso en animales:**

En ausencia de datos disponibles, el producto no debe utilizarse en cachorros de menos de 8 semanas y/o en perros que pesen menos de 1.6 kg. El producto no debe administrarse en intervalos inferiores a 37 días, ya que no se ha analizado la seguridad para intervalos más cortos.

**MSD**

Animal Health



3

Precauciones que debe tomar la persona que administra el producto veterinario a los animales:

Mantener el producto en el envase original hasta su uso, para evitar que los niños tengan acceso al producto. No comer, beber ni fumar mientras se manipula el producto. Lavarse bien las manos con agua y jabón inmediatamente después de utilizar el producto.

Gestación, lactancia y fertilidad:

No se han realizado estudios de seguridad con Bravecto® 1M en perros reproductores, gestantes o lactantes.

Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción:

Durante las pruebas clínicas de campo, no se observaron interacciones entre Bravecto® 1M y los medicamentos veterinarios de uso rutinario.

Sobredosis (signos, procedimientos de emergencia y antídotos):

No se observaron reacciones adversas después de la administración oral a cachorros de 8 semanas de edad y de 1.6 a 2.9 kg de peso tratados con sobredosis de hasta 5 veces la dosis máxima recomendada (22.5 mg, 67.5 mg y 112.5 mg de fluralaner/kg de peso corporal) en tres ocasiones con 30 días de diferencia. Un medicamento veterinario comparable, que difiere en la cantidad de principio activo, fue bien tolerado en Collies con deficiencia de proteína multirresistente 1 (MDR1 -/-) deficiente después de una administración oral única en ~7.5 veces la dosis recomendada (168 mg/kg de peso corporal).

Incompatibilidades:

Ninguna conocida

Precauciones de Almacenamiento:

Almacenar en el blíster original. Utilizarlo inmediatamente una vez abierto. Almacenar a menos de 30°C al abrigo de la luz solar. No congelar ni refrigerar. No se utilice después de la fecha de caducidad que aparece en el blíster. La fecha de caducidad se refiere al último día del mes indicado.

Sobredosis en humanos (síntomas, procedimientos de emergencia y antídotos):

En caso de exposición inadecuada al producto, o ingestión de este, acuda a un Centro Hospitalario y presente la etiqueta del producto.

Precauciones de Almacenamiento:

Almacénese por debajo de 30°C - Protéjase de la luz.

PERIODO DE RETIRO:

No aplica.

PRECAUCIONES PARA LA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO NO UTILIZADO O LOS MATERIALES DE DESECHO:

Si no se describe ninguna especificación especial en la etiqueta para eliminar este producto, deseche de la misma manera en que dispone de otros productos.

INFORMACIÓN ADICIONAL: <https://www.msd-salud-animal.com.pa/>**PARA USO VETERINARIO EXCLUSIVAMENTE.****CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.****MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS.**

ELABORADO POR:

Intervet GesmbH
Austria

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

INTERVET CENTRAL AMERICA S DE RL
Bajo Licencia de Intervet International B.V.

En caso de eventos adversos o farmacovigilancia reportarlo a: farmacovet@merck.com
Copyright © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA and its affiliates. All rights reserved.

Intervet Central América S de RL. Avenida Paseo del Mar, Costa del Este, Torre MMG, Piso 15. Ciudad de Panamá.

www.msd-salud-animal.com.pa